

«Що таке лептоспіроз та заходи його профілактики».

Наприкінці літа та восени відбувається сезонна міграція гризунів. У першу чергу миші й пацюки масово переселяються ближче до людей, шукаючи місця для зимівлі, де є тепло та їжа. Вони селяться у будинках, підвалах, зерносховищах та складах, де живуть до весни. Це створює додатковий ризик поширення особливо небезпечних інфекційних хвороб: лептоспірозу, лістеріозу, туляремії та інших збудників інфекційних захворювань, які передаються через харчові продукти й воду, забруднені сечею і фекаліями інфікованих гризунів, а також через їхні укуси. Лептоспіроз - найнебезпечніша та найпоширеніша із них. Це небезпечне інфекційне захворювання, спільне для людей і тварин, яке залишається найбільш поширеною природно-вогнищевою інфекцією в Одеській області. Через географічні та кліматичні умови, велику кількість річок та водойм в регіоні сформувались стійкі природні та антропогенні осередки інфекції. Загалом в області визначено 33 епізоотичні території. У нас в Ізмайльському районі також є природні осередки лептоспірозу: це селище - Катлабуг Катлабузької ТГ, с.с.Озерне, Ст.Некрасівка, Кислиця, Броска Саф'янівської ТГ, м.Кілія, м.Вилкове та с. Приморське Вилківської ТГ. Та якщо, за останні 3 роки (з 2022 по 2024 роки) в районі випадки не реєструвались (востаннє поодинокі випадки були зареєстровані у 2021 році), то вже в 2025 році зареєстровано 3 випадки лептоспірозу: в м.Ізмаїл, Саф'янівської ТГ та м.Вилкове.

Лептоспіроз- хвороба з високою летальністю (до 20% випадків лептоспірозу може закінчуватись смертю хворої людини) уражає кровеносні судини, печінку, нирки, м'язи, може викликати серйозні ускладнення, зокрема менінгіт, міокардит чи легеневу кровотечу.

Збудник лептоспірозу передається контактним шляхом через слизові оболонки та шкірні покриви. За симптомів лептоспірозу потрібно негайно звернутися до сімейного лікаря, щоб як найраніше почати специфічне бактеріальне лікування — інакше сильно зростають шанси розвитку тяжких ускладнень. Додаткова небезпека лептоспірозу криється у тому, що 90% випадків починається з неспецифічних симптомів, таких як температура 39–40°C та почервоніння очей. Але є і більш характерна симптоматика:

- сильні болі в м'язах, особливо в литках, що посилюються під час пальпації (обмацування);
- порушення згортання крові;
- геморагічний синдром (патологічна кровоточивість);
- пожовтіння очей і шкіри через один-два тижні інкубаційного періоду (за жовтяничної форми хвороби).

Сезонний пік захворюваності на лептоспіроз припадає на серпень, вересень, пов'язаний з заготовкою сіна, польовими роботами, рибалкою, і жовтень-з настанням похолодання та сезонною міграцією гризунів в оселі людей. На рівень захворюваності, безумовно, впливає чисельність мишовидних гризунів, рівень якої залежить, як від природних факторів (наявність кормової бази, стації проживання), так і масштабів проведених дератизаційних заходів, які на сьогодні, в умовах військових дій проводяться вкрай недостатньо.

Як відбувається зараження?

Найчастіше резервуаром збудника лептоспірозу в Україні є сірі щурі та польові миші. Також переносниками інфекції можуть бути бабаки, собаки, СЕД АСКОД Ізмайльська районна державна адміністрація ДОКУМЕНТ № 1/1/01-33/7847 від 17.12.2025 ттоспіроз передається через укус гризуна, оболонки або під час споживання н їжі (молоко, м'ясо) чи води, купання, Підписувач АБАШЕВ РОДІОН АНАТОЛІЙОВИЧ Дійсний з 18.03.2025 8:18:22 по 18.03.2026 23:59:59 ми.



Основний шлях -проникнення лептоспир в організм людини-через ушкоджену шкіру на слизові оболонки людини. Від людини до людини хвороба не передається, за винятком вродженої інфекції та грудного вигодовування.

Разом із тим, є професійні групи з підвищеним ризиком зараження — люди, які працюють з тваринами або на природі, зокрема тваринники, меліоратори, працівники м'ясокомбінатів, робітники очисних споруд і каналізації, мисливці, рибалки, шахтарі.

Профілактика лептоспірозу

1.Підтримуйте чистоту в будинку та на подвір'ї, не залишайте сміття та залишків їжі.

2.Захищайте житло від гризунів:

- замуруйте щілини в стінах;
- ставте сітки;
- використовуйте пастки або родентициди (засоби від гризунів), безпечні для інших тварин і людей.

3.Зберігайте продукти в закритих контейнерах.

4.Пийте лише кип'ячену або бутельовану воду.

5.Добре термічно обробляйте продукти тваринного походження.

6.Мийте руки з милом після контакту з тваринами, землею, та після знаходження в підземних укриттях.

7.Обов'язково, перед вживанням овочів й фруктів добре промивайте їх проточною водою.

8.Не купайтеся у водоймах: зі стоячою водою, поблизу пасовищ. Після купання у річці чи озері прийміть душ. Якщо маєте порізи, — обробіть їх антисептиком.

9.Щороку вакцинують собак і худобу (велика і мала рогата худоба, коні, свині тощо) проти лептоспірозу.

Проблема боротьби та профілактики з лептоспірозом є не тільки медичною і ветеринарною, а й загальнодержавною. Велика роль у досягненні епідемічного благополуччя з лептоспірозу належить профілактичним заходам, які проводяться усіма зацікавленими службами: ветеринарної медицини, комунального, лісового, мисливського господарств, поліції, закладами охорони здоров'я, а також місцевими органами виконавчої влади.

*Тільки сумісними діями усіх зацікавлених служб та відомств, свідомості людей можливе недопущення випадків особливо небезпечного та смертельного захворювання лептоспірозом людей.
Ни нехтуйте своїм здоров'ям! Будьте здорові!*